



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA DESPUÉS DE LA OPERACIÓN DE MARCAPASOS

Incisión:

1. Durante los cuatro primeros días después de la operación, mantenga el área de la incisión seca. Después, lave el área cuidadosamente todos los días con agua y jabón.
2. Deje que las curitas transparentes (Steri-strips) se caigan por sí solas o quítelas 7 días después de la operación.
3. La picazón es un síntoma de cicatrización. Tener puesta una camiseta de algodón sobre el área puede evitar la picazón e irritación. Evite rascarse la incisión.
4. No remoje la incisión (en la tina o piscina) hasta que su doctor se lo indique.
5. NO es normal que esté más enrojecida o hinchada, o que haya dolor o secreción. Si observe alguno de estos síntomas, por favor llame inmediatamente a su doctor.

Dieta:

Lo que su niño come o bebe normalmente.

Actividades:

- Generalmente el niño puede regresar a la escuela después de su visita postoperatoria.
- Actividades tranquilas por dos semanas (que no haga Educación Física en la escuela).
- Por un mes, no levante cosas pesadas (de 10 o más libras) con el brazo que se encuentra en el mismo lado del marcapaso.
- Evite deportes competitivos de contacto (ej. Fútbol americano, fútbol, básquetbol, lucha, etc.) que pueden causar un trauma físico al marcapasos.

Informe inmediatamente de lo siguiente a su doctor o a la enfermera del marcapasos:

- Si el área del marcapasos está más enrojecida o sensible o hay secreción.
- Tiene temperature mayor de 101.5°F.
- Experimenta mareos, desmayos y/o una disminución en el nivel de sus actividades.
- Se queja de latido cardíaco irregular
- Experimenta cualquier trauma físico en el área del marcapasos (ej. una caída o un golpe fuerte)

Consideraciones especiales:

- EVITE lugares con nivel alto de electricidad tales como áreas de soldadura, de alto voltaje y generadores de electricidad.
- Mantenga el área del marcapasos por lo menos a 6 pulgadas de distancia de objetos que contengan imanes como por ejemplo, bocinas grandes de equipos de estéreo, "walki-talkies", herramientas inalámbricas, teléfonos celulares, aparatos de control remoto, etc.
- NO se entretenga cerca de los detectores anti-robo ubicados a la salida de las tiendas.
- NO permita que el personal de seguridad del aeropuerto le pase la barilla magnética del detector de metales sobre el área del marcapasos.

Visitas al dentista:

Hable con el médico del marcapasos para saber si su niño necesita antibióticos antes de ir al dentista.

Identificación:

- Siempre lleve con usted la tarjeta de identificación del marcapasos.
- Usted puede considerar la idea de que su niño se ponga un brazalete médico de identificación.

Cuidados postoperatorios:

- El doctor que puso el marcapasos revisará la herida una semana después de la operación del marcapasos.
- Tendrá visitas regulares en la clínica de marcapasos (por lo menos una cada 6 semanas).
- Exámenes transtelefónicos mensuales (llamadas telefónicas a la casa para examinar el marcapasos).